



DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ECOLOGIQUES

Jean Théodoridès

► To cite this version:

Jean Théodoridès. DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ECOLOGIQUES. Vie et Milieu , 1950, 2, pp.255-256. hal-02506088

HAL Id: hal-02506088

<https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02506088>

Submitted on 12 Mar 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ECOLOGIQUES

A propos de l'écologie de *Penetretus rufipennis* Dej.

(Col. *Carabidae*)

Notre collègue L. SCHULER signale au sujet de Coléoptères hygropétriques (*L'Entomol.*, 6, 1950, p. 29) avoir capturé en abondance *Penetretus rufipennis* Dej. « dans un énorme paquet de racines gorgées d'eau », près du Puy. A ce propos, l'auteur se demande si cet Insecte « se comporte toujours de même », et si l'on peut « le qualifier d'Insecte hygrophile ».

Il semble, en effet, que cette espèce recherche les endroits très mouillés et rentre dans la catégorie des Insectes hygropétriques au sens de A. THIENEMANN et de H. BERTRAND (*L'Entomol.*, 4, 1948, 86-100).

Nous pouvons rapporter ici deux observations tendant à confirmer ceci : V. MAYET (Coléoptères des Albères, 1904, p. 10) signalait déjà cette espèce comme commune sous les pierres très humides et rapportait qu'elle recherche les suintements dans les endroits chauds; de mon côté, j'ai pris à deux reprises (14 et 19 Octobre 1949) plusieurs exemplaires de ce Coléoptère, sous des Mousses, le long d'une paroi rocheuse suintante et parcourue par des ruissellements, dans le Ravin de Pouade, à 6 km. environ au sud de Banyuls. J'en ai également pris deux exemplaires sous les pierres humides, juste au bord du petit ruisseau qui traverse le chemin menant à la Massane, le 21 Décembre 1949.

Il semble donc, d'après ce qui précède, que *P. rufipennis* puisse être ajouté à la liste des Coléoptères hygropétriques donnée par H. BERTRAND (*op. cit.*) et complétée par L. SCHULER (*op. cit.*)

J. THÉODORIDÈS.

Capture de *Harpalus (Actephilus) albanicus* Reitt.

(Col. *Carabidae*)

sur la plage de Banyuls

Mon collègue A. ROUDIER vient de signaler (*L'Entomol.*, V, 1949, 176-7) la capture de *Harpalus (Actephilus) albanicus* Reitt. aux environs de Clermont-Ferrand, et rappelle à cette occasion les localités françaises où cette espèce, toujours rare, a été rencontrée (départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault) ; il cite également les autres pays d'Europe où cette espèce a été trouvée (Albanie, Péninsule balkanique, Italie, Hongrie, Crimée).

Or, parmi des Carabiques récoltés dans des détritiques rejetés par la mer, à la suite d'un orage qui les y avait entraînés, sur la plage de Banyuls, le 10 Octobre 1949, figurait un exemplaire femelle de cette intéressante espèce (G. PÉCOUD det.)

Depuis, A. ROUDIER a eu l'obligeance de me donner des renseignements complémentaires (*in litt.* 1950) sur la répartition de ce Carabique : il est signalé par PUEL, de Puerto-Pajarès (Espagne du Nord) et a été repris en Camargue par mon collègue et ami C. LEGROS, ce qui fait en tout 13 exemplaires seulement dont la capture est signalée sur la côte méditerranéenne.

Comme le fait remarquer A. ROUDIER, la capture de Banyuls est intéressante, car elle relie les stations de l'Hérault à celle d'Espagne, complétant ainsi nos connaissances sur la répartition géographique de ce Coléoptère.

J. THÉODORIDÈS.
