



**HAL**  
open science

## Visite d'une grotte non encore prospectée dans la région de Banyuls

J. Delabie

► **To cite this version:**

J. Delabie. Visite d'une grotte non encore prospectée dans la région de Banyuls. *Vie et Milieu*, 1952, 3 (1), pp.106-108. hal-02537498

**HAL Id: hal-02537498**

**<https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02537498v1>**

Submitted on 8 Apr 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ECOLOGIQUES

---

### *Visite d'une grotte non encore prospectée dans la région de Banyuls*

Cette grotte s'ouvre largement, vers le ciel, sur le versant Ouest d'un petit épaulement du Pic de la Calm, au N. de celui-ci. En contre-bas, coule un torrent qui rejoint la rivière de Banyuls au Mas Cournette. On y accède en remontant un valon du type « Pouade », à partir et à l'Est de ce Mas, ou en descendant du Col de Sabens. Ce Col est jumelé à celui de Banyuls au pied de la Calm.

Position en coordonnées Lambert, carte d'état-major 1/50.000°, couleurs : x = 660,0 ; y = 16,8.

L'entrée en pente est masquée par la végétation après quelques mètres de couvert rocheux. On se glisse à droite, jusqu'au lit du ruisseau souterrain, en contre-bas. Là, l'éclairage artificiel est nécessaire. Cette grotte est très petite, d'un développement d'environ vingt mètres. Elle est coudée à angle droit, l'aval s'orientant vers le N., l'amont, encombré de pierrailles, vers l'E., en prolongement de l'entrée, soit un parcours E.W., puis S.N., le vestibule étant W.E.

Dans le vestibule : trace de feux de bivouac. Un nid dans une anfractuosité de la voûte rocheuse.

Distance à vol d'oiseau de Pouade à la grotte de Sabens : 1.500 mètres.

Une arête rocheuse abrupte sépare les deux vallons. La grotte de Pouade est dans le lit même de son torrent, celle de Sabens, au contraire, est bien à trente mètres au-dessus du torrent adjacent.

### *Remarques*

Chauve-souris.

Quelques ossements de Chèvres.

Dans le guano peu épais, se trouvant dans la branche sa-  
bleuse d'aval, nous n'avons trouvé que des débris de *Rhizotro-*  
*gus marginipes* (Muls.) mais en quantité invraisemblable.

Sous des pierres, dans la pénombre, nous avons recueilli  
une sous-espèce nouvelle d'Isopode, que M. le Professeur VANDEL  
a dédiée à M. le Professeur PETIT :

*Porcellio dilatatus* Br. subsp. *Petiti* Vandel.

Cet Isopode se trouve en compagnie de *Pristonichus terri-*  
*cola* Herbst.

Cette grotte a été prospectée le 28-XI-51, par un temps  
froid, un vent violent, une pluie persistante.

J. DELABIE.

\*\*

Parasitisme de *Labidura riparia* (Pall.)

par *Metarrhizium anisopliae* (Metsch.)

La Muscardine verte *Metarrhizium anisopliae* (Metsch.),  
Champignon *Moniliaceae* s'attaque à divers Insectes dont il pro-  
voque la mort, les recouvrant d'une croûte vert-foncé.

Cette espèce cosmopolite a été retrouvée sur un Dermaptè-  
re : *Labidura riparia* (Pall.) hôte nouveau ; plusieurs individus  
récoltés au bord de l'Étang du Canet en mai 1951 furent trou-  
vés parasités par la Muscardine verte, dans mon cristalliseur  
d'élevage, au Laboratoire Arago, en juillet 1951.

J. THÉODORIDÈS.

\*\*

Une aberration de *Reduvius personatus* L.

(*Reduvidae*)

*REDUVIUS PERSONATUS SAPIENS* aberr.

- Type unique mâle. Montpellier.
- Long : 16 mm.
- Forme générale allongée, étroite.
- Coloration sombre avec yeux *fortement pigmentés* en  
rouge vermillon.

*Tête :*

- Noire étroite; yeux gros, saillants, fortement pigmentés en rouge; ocelles gros.
- Aire interoculaire plus large et plus fortement striée que chez le type.

*Pronotum :*

- Noir, plus étroit que chez *personatus* L. *typicus*.
- Sillon médian très profond. Lobe postérieur fortement vermiculé, sauf au voisinage immédiat des angles postérieurs.
- Côtés du méso et du métanotum très fortement striés.
- Saillies des angles antérieurs plus accusées et plus franchement dirigées en avant.

*Scutellum :*

Noir très nettement rebordé, épine postérieure peu incurvée à l'apex.

*Abdomen :*

- Tergites testacés avec une bande transversale prémédiane noire atteignant le milieu de chaque hémisternite.
- *Connexivum* relativement large à bord noir.

*Ailes :*

Elytres plus larges que chez *personatus* L. *typicus*; en particulier cellule apicale interne plus courte et plus large.

*Appendices :*

Comme chez *personatus* L. *typicus*.

Exemplaire capturé le 24-VII-1949, à 23 heures, dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Eloi (Bibliothèque de l'Internat). (Communiqué à A. VILLIERS).

J.-A. RIOUX, P. VERDIER et P. QUÉZEL.